

اعمال الطبابه العدليه

2- الوقائع الطبيه العدليه:

لايحق للطبيب المعالج البت في هذه القضايا

وتشمل هذه القضايا:

أ- حالات العنه والعقم

ب- الحالات الجنسيه

ج- تقدير العمر

د- اثبات البنوه (بصفة الحامض النووي الدنا و فحص HLA (تطابق الانسجه)

3- الفحص التشريحي:

اهداف الفحص التشريحي:

أ- التوصل الى صيغه اكيده لسبب الوفاة

ب- ربط العلاقه بين الاضرار الخارجيه والعميقه

ت- طبيعة او كيفية الاصابه

ث- الكشف عن الاصابه المسؤوله عن الوفاة في حالة تعدد الاصابات

ج- التوصل الى سبب الوفاة في حالات التسمم والموت المفاجيء

ح- بيان مدى علاقه حاله الصحيه للشخص قبل الوفاة ومدى علاقتها بسبب الوفاة

خ- التوصل فيما اذا كان الشخص قبل وفاته تحت تاثير مخدر او مسكر وبيان علاقه ذلك بسبب الوفاة

د- الكشف عن عوامل ساعدت في احداث الوفاة

ذ- التوصل الى الية حصول الوفاة

الحالات الواجب تشريحها:

1- حالات الموت العنفي : الموت الناتج عن اطلاق الناري ؛ الغرق؛ الاصابات الجرحيه المؤديه للوفاة

2- حالات الموت المفاجيء: هو الموت الذي يحصل بصورة مفاجئه او خلال 24 ساعه من ظهور الاعراض المرضيه0

3- موت التخدير: الذي يحصل على طاولة العمليات او خلال 24 ساعه من اجراء العمليه وهنا تكون المسؤوليه مشتركه بين الطبيب المخدر والجراح0

4- موت المهد(متلازمة موت الرضيع المفاجيءء)

Cot Death

Sudden infant death syndrome(SID)

في هذه المتلازمه تفيد ام الرضيع بانها قد ارضعت طفلها اثناء الليل وفي الصباح وجدته متوفيا في فراشه اما اسباب هذه المتلازمه فهي غير معروفه في 50% من الحالات ولا زالت البحوث مستمره للتوصل الى هذه الاسباب اما في 50% الاخرى من الحالات فان اكثر الاسباب شيوعا هو التهابات الجهاز وخصوصا التهاب القصيبات او قد يكون السبب اختناقيا نتيجة لانقلاب الرضيع على وجهه او لوجود ملابس ضيقه حول الرقبه او التحسس لحليب البقر او تضخم الغده السعترية Thymus

ولوحظ في بعض البحوث التي اجريت على رضع مرشحين للموت بهذه المتلازمه وجود تغير في ST Segment في مخطط القلب الكهربائي كما لوحظ ان تعاطي بعض الادويه من مضادات الهستامين وخصوصا ال (Promethazone) (phenergan) قد يؤدي الى حدوث المتلازمه

تشريحيا يشاهد الرضيع ولديه درجه من طفح الحفظات وتشاهد نزوف في الغده السعترية والقلب والرئتين مع تمدد ضئيل في الرئتين وفي العراق لاتشخص هذه المتلازمه الا نادرا لسببين اولهما حصول ذوي الرضيع على شهادة الوفاة دون تشریح وثانيهما عجز الطبيب عن التوصل الى سبب الوفاة وتسجيله لسبب افتراضي لحصول الوفاة

5- متلازمة الطفل المعذب (المعنى)

Caffey's syndrome

Child abuse syndrome

تشاهد هذه المتلازمة عند الاطفال تحت سن 10 سنوات نتيجة لتعذيبهم من قبل الوالدين وعادة مايكون زوج الام او زوجة الاب وقد يكون الاخ الاكبر

العلامات المشاهدة:أ- يكون الطفل قذر المظهر والملابس وتشاهد عليه علامات سوء التغذية وعادة مايعطي الوالدان معلومات تخالف حقيقة الاصابات الموجوده لدى الطفل

ب- كدمات ذات ازمه مختلفه نتيجة العض او الضغط بالصابع على الجلد او استخدام الاحزمه او الاسواط

ج- ندب ناتجه عن اطفاء اعقاب السكائر على جلد الطفل

د- كسور عديده في العظام الطويله وذات ازمه مختلفه فبعضها يكون في طور الالتئام وبعضها غير ملتئم وهذه الكسور هي التي ادت الى اكتشاف المتلازمه بواسطة طبيب الاشعه (كافي)

هـ- احيانا نشاهد نزوف في الشبكيه

و- تمزقات في الاحشاء الداخليه

ز- سوء استخدام الطفل جنسيا Sexual Abuse

ي- كسور خطيه في الجمجمه ومايرافقها من نزوف سحائيه وخصوصا النزف الدموي المزمّن تحت الام الجافيه او رضوض في الدماغ وتكون اصابة الراس هي المسؤوله عادة عن سبب الوفاة او تكون الوفاة بسبب ذات الرئه نتيجة الضعف المناعي⁰

6- حوادث الطرق

7- النزف الدموي المهبلي

8- الجثث المتفسخه

9- النهي العصبي Reflex vagal inhibition