

①

## Numerical Differentiation :-

أنت قواعد الاشتقاق العادية لا يمكن تطبيقها عندما تكون صيغة الدالة  $f$  غير معروفة بشكل رياضي صريح، أما تكون قيمها معلومة عند عدد محدد من نقاط مجالها، لذا يكون من الضروري وجود بعض الطرق التي تمكننا من إيجاد قيمته تقريبيًا لمنطقة الدالة  $f'$ .

لإيجاد قيمته المشتقة  $f'$  عند نقطة معينة فإننا نقوم بإيجاد صيغة الدالة  $f$  بالاعتماد على معطيات المسألة وبعد ذلك نستق صيغة الدالة وبعدها نجد القيمة العددية للمنطقة عند النقطة المطلوبة.

## ① Forward Difference Formula :-

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[ \Delta y_0 + (2k-1) \frac{\Delta^2 y_0}{2} + (3k^2-6k+2) \frac{\Delta^3 y_0}{6} + (4k^3-18k^2+22k-6) \frac{\Delta^4 y_0}{24} + \dots \right]$$

$$f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{h^2} \left[ \Delta^2 y_0 + (k-1) \Delta^3 y_0 + \left( \frac{1}{2} k^2 - \frac{3}{2} k + \frac{11}{12} \right) \Delta^4 y_0 + \dots \right]$$

## ② Backward Difference Formula :-

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[ \nabla y_n + (2k+1) \frac{\nabla^2 y_n}{2} + (3k^2+6k+2) \frac{\nabla^3 y_n}{6} + (4k^3+18k^2+22k+6) \frac{\nabla^4 y_n}{24} + \dots \right]$$

$$f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{h^2} \left[ \nabla^2 y_n + (k+1) \nabla^3 y_n + \left( \frac{1}{2} k^2 + \frac{3}{2} k + \frac{11}{12} \right) \nabla^4 y_n + \dots \right]$$

(2)

Example:-

Find the derivatives  $f'(2.2)$ ,  $f''(2.2)$ ,  $f'(9.3)$ ,  $f''(9.3)$  by using the following data

$x_i$	2	4	6	8	10
$y_i$	2	1	3	8	20

Solution:-

In the beginning we find the derivatives  $f'(2.2)$ ,  $f''(2.2)$

$$h = 2, x = 2.2, x_0 = 2, k = \frac{2.2 - 2}{2} = 0.1$$

$x_i$	$y_i$	$\Delta y_i$	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$
2	2	-1	3	0	4
4	1	2	3	4	
6	3	5	7		
8	8	12			
10	20				

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left[ \Delta y_0 + (2k-1) \frac{\Delta^2 y_0}{2} + (3k^2 - 6k + 2) \frac{\Delta^3 y_0}{6} + (4k^3 - 18k^2 + 22k - 6) \frac{\Delta^4 y_0}{24} \right]$$

$$f'(2.2) = \frac{1}{2} \left[ (-1) + (2 \cdot 0.1 - 1) \frac{3}{2} + (3(0.1)^2 - 6(0.1) + 2) \frac{0}{6} + (4(0.1)^3 - 18(0.1)^2 + 22(0.1) - 6) \frac{4}{24} \right] = -1.431$$

$$\therefore f'(2.2) = -1.431$$

③

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} \left[ \Delta^2 y_0 + (k-1) \Delta^3 y_0 + \left( \frac{1}{2} k^2 - \frac{3}{2} k + \frac{11}{12} \right) \Delta^4 y_0 \right]$$

$$f''(2.2) = \frac{1}{4} \left[ 3 + (0.1 - 1)(0) + \left( \frac{1}{2} (0.1)^2 - \frac{3}{2} (0.1) + \frac{11}{12} \right) * 4 \right]$$

$$= 1.522$$

$$\therefore f''(2.2) = 1.522$$

Now we find the derivatives  $f'(9.3)$ ,  $f''(9.3)$

$$h=2, x=9.3, x_n=2, k = \frac{9.3 - 10}{2} = \boxed{-0.35}$$

$x_i$	$y_i$	$\nabla y_i$	$\nabla^2 y_i$	$\nabla^3 y_i$	$\nabla^4 y_i$
2	2				
4	1	-1			
6	3	2	3		
8	8	5	3	0	
10	20	12	7	4	4

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left[ \nabla y_n + (2k+1) \frac{\nabla^2 y_n}{2} + (3k^2 + 6k + 2) \frac{\nabla^3 y_n}{6} + (4k^3 + 18k^2 + 22k + 6) \frac{\nabla^4 y_n}{24} \right]$$

$$f'(9.3) = \frac{1}{2} \left[ 12 + (2(-0.35) + 1) \frac{7}{2} + (3(-0.35)^2 + 6(-0.35) + 2) \frac{4}{6} + (4(-0.35)^3 + 18(-0.35)^2 + 22(-0.35) + 6) \frac{4}{24} \right] = 6.642$$

$$\therefore f'(9.3) = 6.642$$

④

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} \left[ \nabla^2 y_n + (k+1) \nabla^3 y_n + \left( \frac{1}{2} k^2 + \frac{3}{2} k + \frac{11}{12} \right) \nabla^4 y_n \right]$$

$$f''(9.3) = ?? \text{ (H.W.)}$$

Exercise:-

Find the derivatives  $f'(3.7)$ ,  $f''(3.7)$ ,  $f'(13)$ ,  $f''(13)$  by using the following data

x	3	6	9	12	15
y	2	1	5	7	10