



10- تفتت الأراضي الصالحة لزراعة الرز على عدد كبير من المزارعين.

س: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل رفع الإنتاج؟

1- استخدام بذور جديدة محسنة.

2- استخدام الأسمدة.

3- مكافحة الآفات الزراعية.

4- الالتزام بمواعيد الزراعة.

5- اتباع الدورة الزراعية من أجل المحافظة على التربة.

4- الذرة الصفراء (الشامية): من الحبوب المهمة تستخدم كغذاء للإنسان والحيوان واستخدامها في

بعض الصناعات كصناعة النشا، والذرة من المحاصيل الصيفية فهي تحت درجة حرارة ما بين (65-75) فهرنهايت، وتحتاج من الماء ما بين (20-40) بوصة سنوياً فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي تحتل مصر المركز الأول ويأتي بعدها كل من المملكة المغربية والسودان والعراق، والذرة من المحاصيل التي تزداد زراعتها سنة بعد أخرى والسبب في ذلك تربية الدواجن وتعتبر الذرة غذاء لها بالإضافة ان مناخ الوطن العربي يساعد على زراعتها إلى دخولها في صناعة الزيوت النباتية.

أ- الذرة الصفراء في العراق: من المحاصيل الصيفية في العراق وتستخدم بالدرجة الأولى علف للحيوان وخاصة الدواجن وتتركز زراعتها في جميع المحافظات ماعدا محافظة البصرة وذي قار والقادسية وكربلاء واربيل.

ب- الذرة البيضاء في العراق: محصول صيفي أيضاً تستخدم غذاء للحيوانات وتزرع في جميع محافظات القطر.